

# INGREPENFORMULIER TROMBOSEDIENST

**Dit formulier dient zo mogelijk 1 week voor de ingreep/opname in het bezit van de trombosedienst te zijn.**

Patiëntetiket

Naam	
Adres	
Postcode/woonplaats	
Geboortedatum	
Geslacht M/V	BSN
Telefoonnummer	
Verzekering/polisnummer	
Huisarts	

**Trombosedienst Eindhoven**

Tel. (040) 214 12 62

[info@TDRE.nl](mailto:info@TDRE.nl)

**Trombosedienst Geldrop – Anna ZH**

Tel. (040) 286 40 60

[trombosedienst@st-anna.nl](mailto:trombosedienst@st-anna.nl)

**Trombosedienst Helmond – Elkerliek ZH**

Tel. (0492) 59 59 73

[trombosedienst@elkerliek.nl](mailto:trombosedienst@elkerliek.nl)

## In te vullen door operateur

**Datum ingreep**

**Ingreep**

**Patiënt gebruikt**  Acenocoumarol  Fenprocoumon/Marcoumar

**Tromboserisico\***  Hoog  Laag  
**\*Voor toelichting zie bijlage**

**Bloedingsrisico**  Hoog  Intermediair  Laag

**Voor bloedingsrisico bij invasieve ingrepen, volg richtlijn eigen ziekenhuis**

Voor Anna Ziekenhuis: zie tabel A voorschrift Staken en hervatten antitrombotische behandeling rondom ingreep

- Antistollingstherapie continueren
- Antistolling stoppen zonder overbruggingstherapie
- Antistolling stoppen met overbruggingstherapie ivm verhoogd trombose risico\*  
gewicht patiënt: \_\_\_\_\_ kg eGFR: \_\_\_\_\_ ml/min/slo

Gewenste INR:  ≤ 1.5  < 1.8  1.8-2.2  ≤ 3.5  anders: \_\_\_\_\_

- Overlegd met voorschrijver antistolling \_\_\_\_\_  
De verantwoordelijkheid voor het staken ligt primair bij de arts die de ingreep verricht, tenzij overlegd met voorschrijver.*

Naam

Functie

Tel./sein

Datum

Handtekening arts:

## BIJLAGE INGREPENFORMULIER TROMBOSEDIENST

Tabel tromboserisico

Risico	Klinische status
Hoog (>10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geïsoleerd atriumfibrilleren, zonder klepgebrek, met CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC 8-9</li> <li>Geïsoleerd atriumfibrilleren met reumatische hartziekte</li> <li>Atriumfibrilleren met mechanische hartklep</li> <li>Atriumfibrilleren met recent (&lt; 6 maanden) herseninfarct/TIA ongeacht de CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC-score</li> <li>Bij biokleppen (inclusief TAVI) &lt; 3 maanden geleden geplaatst, alleen op indicatie van de operateur</li> <li>Mechanische hartklep in mitralis, tricuspidalis of pulmonalis positie</li> <li>Aortamechanoprothesen met extra risicofactor in overleg met de operateur</li> <li>Hartkleprothese (inclusief bioklep) met extra risicofactor *</li> <li>Mechanische hartklep oud model: caged ball, tilting disc (Starr-Edwards, Björk-Shiley)</li> <li>Intracardiale trombus</li> <li>Antifosfolipidensyndroom</li> <li>&lt; 3 maanden na TIA/CVA</li> <li>Recidiverend herseninfarct/TIA bij symptomatische stenose a. carotis interna</li> <li>Chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie #</li> <li>&lt; 3 maanden na VTE</li> <li>Recidief VTE onder stabiele antistolling (&gt; 1 maand)</li> <li>Recidief VTE bij eerdere tijdelijke onderbreking van antistolling (ook &gt;3 maanden laatste event)</li> </ul>
Laag (<10%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Geïsoleerd atriumfibrilleren CHA<sub>2</sub>DS<sub>2</sub>-VASC: 0-7 en geen recent (&lt;6 maanden) herseninfarct/TIA</li> <li>Mechanische hartklep in aortapositie &gt;3 maanden geleden geplaatst zonder extra risicofactor*</li> <li>Bioklep &gt; 3 maanden geleden geplaatst</li> <li>Recidiverend TIA/CVA zonder additionele hoog risicofactor cardiale emboliebron (atriumfibrilleren, symptomatische, significante stenose a. carotis interna, antifosfolipidensyndroom)</li> <li>Eenmalig herseninfarct/TIA</li> <li>&gt; 3 maanden na VTE</li> <li>&gt; 3 maanden na eerste of recidief VTE en geen recidief onder antistolling</li> </ul>
<p>* Risicofactoren zijn: atriumfibrilleren, linker ventrikel ejectiefractie &lt;35 %, voorgeschiedenis van tromboembolie.</p> <p># Dit betreft patiënten met aangetoonde CTEPH die nog geen pulmonalis endarterectomie hebben ondergaan, of waarbij de pulmonalis endarterectomie niet tot normalisatie van de drukken heeft geleid.</p> <p>Patiënten in de chronische stabiele fase van de ziekte na een succesvolle pulmonalis endarterectomie vallen in de laag risico categorie</p>	

Tabel CHA2DS2-VASC-score

Comorbiditeit	Punten
Congestief hartfalen	1
Hypertensie	1
Leeftijd > 75 jaar	2
Diabetes mellitus	1
Eerdere TIA/CVA of arteriele embolie	2
Coronarialijden of perifereer vaatlijden	1
Leeftijd 65-74 jaar	1
Vrouwelijk geslacht	1