

**Urineverlies overdag: incontinentie**

Alle vormen van verliezen van urine overdag. Het gaat dus om onzindelijk voor urine niet tijdens de slaap *met of zonder* bijkomende symptomen *met of zonder* lichamelijke oorzaak.

**Nachtelijk urineverlies: enuresis**

Een onwillekeurige lozing van urine gedurende de slaap, minstens 2 keer per week gedurende 4 weken voor minstens 3 opeenvolgende maanden bij kinderen > 5 jaar, niet veroorzaakt door somatische ziekten en zonder andere klachten/symptomen.

Onderscheid wordt gemaakt in:

- a. Primaire vorm: vanaf de geboorte aanwezig;
- b. Secundaire vorm: na periode van 6 maanden volledig droog zijn gedurende de slaap wederom in bed plassen.

**Fecale incontinentie**

(onvrijwillig) Ontlastingsverlies (in het ondergoed of in de luier) boven de leeftijd van 4 jaar. Dit kan overdag of 's nachts plaatsvinden. Vanaf 2005 worden begrippen als encopresis en soiling niet meer gebruikt.

Een onderverdeling wordt gemaakt in:

- a. Fecale incontinentie door een organische oorzaak (bijvoorbeeld neurologisch of gastro-intestinaal);
- b. Fecale incontinentie door anorectale chirurgie (bij misvormingen, aangeboren of verworven);
- c. Functionele fecale incontinentie:
  - op basis van obstipatie;
  - zonder faecesretentie, solitaire fecale incontinentie genaamd (deze kinderen verliezen ontlasting zonder dat ze symptomen van obstipatie hebben).

**Obstipatie**

De diagnose obstipatie wordt gesteld aan de hand van de Rome IV-criteria, waarbij ten minste 2 van de volgende symptomen bij kinderen aanwezig moeten zijn:

1. Defecatiefrequentie  $\leq 2$  per week.
2. Fecale incontinentie > 1 episode per week indien zindelijk.
3. Ophouden van ontlasting.
4. Pijnlijke of harde, keutelige defecatie.
5. Grote hoeveelheid ontlasting in luier/toilet.
6. Grote fecale massa in abdomen of rectum.