

Formularium Dermatologische Bereidingen

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

A Bases en indifferente middelen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
geen	HP	Zinkoxide smeersel	Natte huid, indrogend effect
geen	HP	Zinkzalf 10%	Natte huid, indrogend effect
geen	HP	Lanette I creme / Cetomacrogolcreme FNA ¹	Neutrale huid
geen	HP	Vaselinelanettecreme / Vaselinecetomacrogolcreme FNA ¹	Droge huid, hydraterend; 22,5% vaseline
geen	BER	Vaseline/lanette I creme aa	Droge huid, hydraterend; 50% vaseline
geen	HP	Koelzalf	= Ung.Leniens; Droge huid, hydraterend
geen	BER	Basis voor lanettezalf of cetomacrogolzalf ¹ + 25% Cetiol V	Droge behaarde hoofdhuid
geen	HP	Lanettezalf / Cetomacrogolzalf FNA ¹	Zeer droge huid; sterk hydraterend
geen	HP	Vaseline	Zeer droge huid; sterk hydraterend
geen	BER	Paraffine vloeibaar 20% in vaseline	Emolliens

B Middelen bij inflammatoire dermatosen

B 10 Dermatocorticosteroiden

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
hydrocortison	HP	hydrocortisoncreme 1%	klasse 1
hydrocortison	HP	hydrocortisonzalf 1%	klasse 1
triamcinolon	HP	triamcinoloncrème 0,1%	klasse 2
triamcinolon	HP	triamcinolonzalf 0,1%	klasse 2
triamcinolon	BER	triamcinolon 0,1% in zinkoxide-smeersel	klasse 2; nattende aandoening
triamcinolon	BER	triamcinolon 0,1% in hypromellose 20% FNA	klasse 2; aandoeningen in de mond
klasse 3 corticosteroiden	HP	diverse preparaten, bv Cutivate zalf/creme ¹	klasse 3
klasse 3 corticosteroiden	HP	diverse preparaten, bv Topicorte creme, Betnelan lotion ¹	klasse 3; hoofdhuid
klasse 4 corticosteroiden	HP	diverse preparaten, bv Dermovate zalf/creme ¹	klasse 4

B 20 Combinaties van corticosteroiden met penetratiebevorderende middelen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
triamcinolonacetonide	BER	Triamcinolonsalicylzuuroplossing FNA	klasse 2
triamcinolonacetonide	BER	Triamcinolonsalicylzuurcreme 0,1%/5% LNA	klasse 2
desoximetason	BER	Topicorte creme met 5% en 10% salicylzuur	klasse 3; ook hoofdhuid; houdbaarheid 10 weken (bron: Aventis)
clobetasol	BER	Dermovate creme of zalf met 5% salicylzuur	klasse 4; houdbaarheid 35 dagen (bron: GSK)

B 30 Combinaties van corticosteroiden met antimicrobiële middelen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
triamcinolon	BER	Triamcinolonacetonide 0,1% in fusidinezuurcreme of zalf	Maximaal 2 weken. Geen mupirocine (Bactroban®): dit wordt voor MRSA gereserveerd

Formularium Dermatologische Bereidingen

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

B Middelen bij inflammatoire dermatosen

B 40 Overige lokale middelen bij inflammatoire dermatosen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
teren	BER	Zie teerformularium	constitutioneel eczeem en psoriasis; doorgaans 2 ^e lijn; steunpunt-bereiding; cave zwangerschap
koolteer/levomenthol	HP	Denorex RX shampoo	seborroïsch eczeem
calcipotriol	HP	Calcipotriol zalf	
calcitriol	HP	Silkis	
ditranol	BER	Ditranol zalf/creme FNA	diverse concentraties; 2 ^e lijn
ketoconazol	HP	Ketoconazol hoofdgel	seborroïsch eczeem
seleensulfide	HP	Selsun 2,5% suspensie	pityriasis versicolor

C Middelen bij huidinfecties

C 10 Bacteriële huidinfecties

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
fusidinezuur	HP	Fucidin creme/zalf 2%	voor kortdurend gebruik (max 2 weken)
zilver sulfadiazine	HP	Flammazine creme 1%	eerste keus bij brandwonden

C 20 Virale huidinfecties

Werkzame stof ²	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
salicylzuur	BER	salicylzuur 20% in vaseline	wratten
salicylzuur	BER	salicylzuur 40% in vaseline	wratten
salicylzuur	HP	formule W	17% in collodium; wratten

C 30 Dermatomycosen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
miconazol	HP	Daktarin creme 2%	miconazol is de standaard maar wordt niet vergoed door de verzekeraar
miconazol	HP	Dactacort creme	met hydrocortison; indien m.n. ontsteking
miconazol	BER	Miconazol 2% in zinkoxidesmeersel	nattende aandoening
ketoconazol	BER	Hydrocortisonacetaat 1% in ketoconazol 2% creme	seborrhoïsch eczeem; terbinafine (Lamisil®) werkt niet bij de hierbij betrokken gist; houdbaarheid 1 maand.
ketoconazol	BER	Triamcinolonacetonide 0,1% in ketoconazol 2% creme	doorgaans 2e lijn; houdbaarheid 1 jaar (bron: Janssen-Cilag)

C 40 Parasitosen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
permethrine	HP	Loxazol	1e lijn; hoofd- en schaamluis. Scabies, 1e keus; niet bij zwangeren en zuigelingen
benzylbenzoaat	BER	Benzylbenzoaat 25% smeersel FNA	scabies; bij contra indicatie permethrine

Formularium Dermatologische Bereidingen

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

D Middelen bij acne vulgaris

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
benzoylperoxide	HP	benzoylperoxide 5 en 10% hydrogel	Minimaal 3 maanden voorschrijven. Heeft een blekende werking op haren en gekleurd textiel
clindamycine	HP	diverse preparaten, bv Dalacin	
erytromycine	HP	diverse preparaten	
metronidazol	HP	Rozex 0,75% gel; Creme 0,75% en 1%	Acne rosacea
tretinoïne	HP	Acid A Vit 0,05% creme	2e lijn; cave zwangerschap
tretinoïne	BER	Tretinoïnecreme 0,02% FNA	2e lijn; indien 0,05% teveel irriteert; cave zwangerschap
adapaleen	HP	Differin 0,1% gel	2e lijn; cave zwangerschap

E Middelen bij jeuk

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
geen	HP	Koelzalf	= Unguentum Leniens; Droge huid ³ , hydraterend
levomenthol	HP	levomenthol 1% creme	Geen poeder of gel voorschrijven: deze kunnen orthoergische dermatitis veroorzaken

F Middelen bij wondbehandeling en desinfectie van de huid⁴

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
chloorhexidine	HP	Sterilon creme 1%; vloeistof 1%	huid- en wonddesinfectie; chloorhexidine wordt niet vergoed door de verzekeraar
povidon-jodium	HP	diverse merken	huid- en wonddesinfectie
natriumhypochloriet	BER	natriumhypochlorietsmeersel FNA	decubitus met necrose

G Middelen bij hemorroïden

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
zinksulfaat	BER	Zinksulfaatvaselinecreme 0,5% FNA	adstringerend
lidocaine	BER	Lidocainevaselinecreme 3% FNA	lokaal anaesthetisch

Formularium Dermatologische Bereidingen

Regionale Transmurale Afspraak Zuidoost Brabant

H Overige middelen bij huidaandoeningen

Werkzame stof	Herkomst	Naam	Bijzonderheden
aluminiumchloride	BER	Aluminiumchloride oplossing 20% FNA	hyperhidrosis; min. 1 week dagelijks toepassen, daarna zonodig
fluorouracil	HP	Efudix 5% creme	actinische keratose; cave zwangerschap
hydrochinon / tretinoïne / hydrocortison	BER	Hydrochinon 5%, Tretinoïne 0,01-0,02%, hydrocortison 1% in propyleenglycol / ethyleenglycol aa	2e lijn; hyperpigmentatie; cave zwangerschap
isosorbidedinitraat	BER	Isosorbidedinitraatvaselinecreme FNA 1%	anale fissuur; overdag iedere 3 uur aanbrengen, behandelduur 6-12 weken. Cave bijwerking: hoofdpijn
salicylzuur ⁵	BER	salicylzuur 10% in vaseline	keratolyticum
salicylzuur ⁵	BER	salicylzuur 20% in vaseline	keratolyticum
salicylzuur ⁵	BER	salicylzuur 40% in vaseline	keratolyticum
salicylzuur ⁵	BER	salicylzuur 10% in basis voor lanettezalf + 25% CetiolV	keratolyticum voor de hoofdhuid

Voetnoten

1 Lokaal kan in FTO groepen een keuze afgesproken worden tussen de geboden alternatieven

2 Geneesmiddelen tegen herpes (aciclovir, penciclovir) zijn niet vermeld omdat bij deze aandoening lokale therapie niet zinvol is

3 Bij de behandeling van jeuk veroorzaakt door een droge huid kan het beste vette zalf ipv creme worden voorgeschreven. Bovendien moet het gebruik van zeep of andere detergentia worden afgeraden.

4 Wondbehandeling geschiedt op grond van soort wond en WCS-kleuren classificatie, waarbij naast geneesmiddelen voornamelijk wondbedekkers worden gebruikt.

De wond- en decubitusconsulent kan informatie verstrekken over deze ingewikkelde materie.

5 Minder dan 5% salicylzuur is over het algemeen weinig werkzaam bij hyperkeratose.

Deze regionale transmurale afspraak is ontwikkeld in samenwerking met de transmurale organisaties HaCa, Quartz, SMáSH en THEMA.